



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL ARE SIMPTOME SPECIFICE UNEI INFECȚII RESPIRATORII TREBUIE SĂ VĂ ADRESAȚI:

- **Medicului de familie în cabinet sau la centrul de permanență. Acesta va consulta și evalua clinic copilul și va prescrie tratamentul corespunzător**
- **În cazul în care simptomele durează mai mult de 3 zile sau se agravează starea copilului, mergeți la un Centru de evaluare. Copilul va fi evaluat clinic, imagistic și biologic de medicii specialiști**
- **Copiii cu simptomatologie severă sau cei cu factori de risc vor fi direcționați de medicul de familie sau din centrul de evaluare către camerele de gardă / unitățile de primiri urgențe**



MINISTERUL SĂNĂȚII

# CARE SUNT SIMPTOMELE GRIPEI?

- **Febră cu valori crescute ( $> 38,5-39^{\circ}\text{C}$ ) cu durată de 3-5 zile**
- **Frison**
- **Cefalee și dureri de gât**
- **Tuse persistentă**
- **Dureri musculare persistente și dureri articulare**
- **Astenie fizică marcată**

**Simptomele debutează brusc și durează 7 - 10 zile**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# PARTICULARITĂȚILE TABLOULUI CLINIC AL GRIPEI LA SUGAR ȘI COPILUL MIC:

- **Febră înaltă (peste 39°C)**
- **Manifestări digestive (diaree, vărsături, dureri abdominale)**
- **Dificultăți respiratorii**
- **Episoade frecvente de otite și laringite**
- **Miozită**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# CONDUITA TERAPEUTICĂ LA COPII ÎN CAZUL GRIPEI

- **Prezentați-vă sau consultați medicul de familie pentru evaluare în vederea stabilirii conduitei terapeutice**
- **Hidratarea corespunzătoare a copilului (ceai, apă, sucuri naturale)**
- **Febra de peste 38,5°C se tratează cu paracetamol sau ibuprofen la indicațiile medicului, în funcție de vârsta copilului**
- **Îndepărtați secrețiile nazale pentru a ușura respirația**
- **Tratamentul antiviral cu Oseltamivir se poate administra numai la indicația medicului, pe bază de prescripție**
- **Gripa NU se tratează cu antibiotice**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# CARE SUNT SIMPTOMELE INFECȚIEI CU VIRUS SINCİȚIAL RESPIRATOR (VSR)

- Tuse
- Secreții nazale
- Febră
- Respirație șuierătoare
- Respirație rapidă
- Apnee la sugari (pauze în respirație)

Simptomele durează circa 2  
săptămâni





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# CARE SUNT SIMPTOMELE RĂCELII COMUNE

- **Obstrucție nazală (nas înfundat)**
- **Secreții nazale abundente**
- **Tuse sporadică**
- **Dureri în gât**
- **Subfebrilitate (până la 38°C) sau febră moderată**
- **Evoluție autolimitată**

**Simptomele debutează progresiv și durează max. 5 - 7 zile**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# CONDUITA TERAPEUTICĂ LA COPII ÎN CAZUL RĂCELII COMUNE

- Informare și evaluare de către medicul de familie
- Oferiți lichide pentru hidratarea copilului
- Îndepărtați secrețiile nazale pentru a ușura respirația
- Febra de peste 38,5°C se tratează cu paracetamol sau ibuprofen la indicațiile medicului, în funcție de vârsta copilului
- **NU se recomandă antibiotice**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# SIMPTOME COVID-19

- **Febră**
- **Tuse**
- **Oboseală**
- **Dificultăți de respirație**
- **Dureri în gât**
- **Răgușeală**
- **Vărsături / diaree sau pierderea gustului / mirosului**
- **Dureri de cap**

